US 7067
(SWCH 4749 BG II)

» પ્રથમ બે વીણી માં મુખ્ય ઉપજ
» મોટા જીંડવા
» વિણવા મા સરળ
» મહારાષ્ટ્ર, ગુજરાત, મધ્યપ્રદેશ, આંધ્રપ્રદેશ, તેલંગાણા, કર્ણાટક અને તમિલનાડુ માટે ભલામણ કરેલ છે.



US 704 BG II

» મોટા અને એકસમાન જીંડવા
» સીરીઝ માં જીંડવા
» યૂસીયા પ્રકારની જીવાત સામે સહનશીલતા
» આંધ્રપ્રદેશ, તેલંગાણા, કર્ણાટક, તમિલનાડુ, મહારાષ્ટ્ર,મધ્યપ્રદેશ અને ગુજરાત માટે ભલામણ કરેલ



US 4708
(SWCH 4708 BG II)

» સિરીજમાં જીંડવા
» મધ્યમ સમય મા પાકતી જાત
» વીણી કરવામાં સરળ
» યૂસીયા પ્રકારની જીવાત સામે સહનશીલતા
» આંધ્રપ્રદેશ, તેલંગાણા, કર્ણાટક, તમિલનાડુ, મહારાષ્ટ્ર,મધ્યપ્રદેશ અને ગુજરાત માટે ભલામણ કરેલ



US 4753
(SWCH 4753 BG II)

» મોટા જીંડવા
» યૂસીયા પ્રકારની જીવાત સામે સહનશીલતા
» સિરીજમાં જીંડવા
» આંધ્રપ્રદેશ, તેલંગાણા, કર્ણાટક, તમિલનાડુ, મહારાષ્ટ્ર,મધ્યપ્રદેશ અને ગુજરાત માટે ભલામણ કરેલ



SWCH 4754 BG II
(US 4754)

» વધુ સંખ્યામાં જીંડવા
» વીણી કરવામાં સરળ
» વધુ ઉપજ
» મહારાષ્ટ્ર,મધ્યપ્રદેશ અને ગુજરાત માટે ભલામણ કરેલ



US 4823
(SWCH 4823 BG II)

» વહેલા પાકતા હાઇબ્રિડ
» ખૂબ જ ફળદાયી ટીંડા
» HDPS માટે યોગ્ય
» આંધ્રપ્રદેશ, તેલંગાણા, કર્ણાટક, તમિલનાડુ, મહારાષ્ટ્ર,મધ્યપ્રદેશ અને ગુજરાત માટે ભલામણ કરેલ



US Agriseeds®
Seed that Works

SEEDWORKS®

કપાસના પાકનું સંચાલન



બીજ દર

1.5-2 પેકેટ/એકર

રાજ્ય	અંતર: (હારથી હાર અને છોડથી છોડ)
ગુજરાત	140*45

છોડના પ્રકાર અને જમીનના પ્રકારને આધારે અંતરમાં ફેરફાર કરવાની જરૂર છે



નીંદણ નિયંત્રણ

પ્રથમ 8-10 અઠવાડિયામાં ગંભીર

ઘાસવાળું નીંદણ નિયંત્રણ: પેન્ડીમેથાલિન @ 1 લિટર/એકર (પ્રી-ઇમર્જન્ટ)
ક્વિઝલાફોપ ઇથિલ/ ફેનોક્સાપ્રોપ-પી-ઇથિલ @ 400 મિલી/એસી (પોસ્ટ-ઇમર્જન્ટ)

પહોળા પાંદડાવાળા નીંદણ નિયંત્રણ: પાયરિથિયોબેક સોડિયમ @ 300 મિલી/એકર (પ્રારંભિક ઉદભવ પછી)



ખાતરનું વ્યવસ્થાપન (kg/Ac)

રાજ્ય	N	P	K
ગુજરાત	64	20	24





જંતુ વ્યવસ્થાપન & રોગ વ્યવસ્થાપન

ગુલાબી ઇયળ : (પ્રમાણ/ 10 લિટર પાણી)
ફેરોમોન ટ્રેપ્સ:
2 ટ્રેપ્સ/એકર - મોથ એક્ટિવિટીનું નિરીક્ષણ કરવું
8 ટ્રેપ્સ/એકર- સમાગમમાં વિક્ષેપ માટે
50 થી 60 દિવસ: લીમડાનું તેલ @ 50ml
60 થી 90 દિવસ: પ્રોફેનોફોસ @ 30 મિલી
ક્લોરોપાયરીફોસ @ 25 મિલી
90 થી 120 દિવસ: ક્વિનાલફોસ @ 25 મિલી
આલ્ફામેથ્રિન @ 6 મિલી
120 દિવસથી ઉપર: સાયપરમેથ્રિન (10EC)@10ml
ડેલ્ટામેથ્રિન @ 10 મિલી

શોષક જીવાત: (માત્રા/એકર)
સફેદ માખી:
પાયરીપ્રોક્સીફેન @ 500ml/એકર
ડીનોટેફ્યુરાન @ 60 ગ્રામ/એકર
લીલી પોપટી :
ફ્લોનીકામીડ @ 80 ગ્રામ/એકર
થિયામેથોક્સમ @ 40 ગ્રામ/એકર

ફ્યુઝેરિયમ વિલ્ટ:
થાયરમ@2 ગ્રામ/કિલો બીજ સાથે બીજ માવજત કરો
કાર્બેન્ડાઝીમ @ 2 ગ્રામ/લીટર પાણીથી ડ્રિંચિંગ
રુટ રોટ:
કાર્બેન્ડાઝીમ @ 2 ગ્રામ/લીટર પાણીથી ડ્રિંચિંગ

બેક્ટેરિયલ બ્લાઇટ:
કાર્બોક્સિન @ 1.5 ગ્રામ/કિલો બીજ સાથે બીજ માવજત કરો
COC @ 500 g સ્પ્રે કરો + એગ્રિમાયસીન 20g/ac અથવા સ્ટ્રેપ્ટોસાયકલીન @ 3 gm/acre
પેરાવિલ્ટ:
કોબાલ્ટ ક્લોરાઇડ 1 ગ્રામ/100 લિટર પાણી/એકર

બીજા મહત્વના મુદ્દા

- પાકની ફેરબદલી અને ઊંડી ખેડાણ
- છોડની વૃદ્ધિ અને વિકાસ માટે સૂક્ષ્મ પોષકતત્ત્વો - ઝિંક (1 ગ્રામ/લિટર) અને બોરોન (1-1.5 ગ્રામ/લિટર) લાગુ કરો
- જંતુઓ અને રોગોના ફેલાવાને ટાળવા માટે નીંદણ નિયંત્રણ મુખ્યત્વે કોંગ્રેસ ઘાસ નો નાસ કરો
- શેષ દાંડીઓ અને આંશિક રીતે ખુલેલા બોલના ક્ષેત્રોને સાફ કરો
- છોડ સુકાઈ ન જાય તે માટે ખેતરમાં સારી ડ્રેનેજ જાળવો