US Agriseeds®
Seed that Works

SEEDWORKS®

US 7067
(SWCH 4749 BG II)

» ಮೊದಲ 2 ಆರಿಸುವಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಇಳುವರಿ
» ದೊಡ್ಡ ಕಾಯಿ ಗಾತ್ರ
» ಸುಲಭವಾಗಿ ಆಯ್ದುಕೊಳ್ಳುವಿಕೆ
» ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶ, ತೆಲಂಗಾಣ, ಕರ್ನಾಟಕ, ತಮಿಳುನಾಡು, ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ, ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ ಮತ್ತು ಗುಜರಾತ್ ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ



US 704 BG II

» ದೊಡ್ಡ ಮತ್ತು ಏಕರೂಪದ ಕಾಯಿಗಳು
» ಉತ್ತಮ ಕಾಯಿ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಿಕೆ
» ಹೀರುವ ಕೀಟಗಳಿಗೆ ಸಹಿಷ್ಣುತೆ
» ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶ, ತೆಲಂಗಾಣ, ಕರ್ನಾಟಕ, ತಮಿಳುನಾಡು, ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ, ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ ಮತ್ತು ಗುಜರಾತ್ ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ



US 707 BG II

» ಹೆಚ್ಚು ಕಾಯಿಗಳು ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚು ಇಳುವರಿ
» ಒತ್ತಡ ಸಹಿಷ್ಣುತೆ
» ಉತ್ತಮ ಕಾಯಿ ಒಡೆಯುವಿಕೆ ಮತ್ತು ಸುಲಭವಾಗಿ ಆಯ್ದುಕೊಳ್ಳುವಿಕೆ
» ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶ, ತೆಲಂಗಾಣ, ಕರ್ನಾಟಕ, ತಮಿಳುನಾಡು ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ



US 4708
(SWCH 4708 BG II)

» ಸರಪಳಿ ಕಾಯಿ ಬಿಡುವಿಕೆ ಮತ್ತು ಅಧಿಕ ಇಳುವರಿ
» ಮಧ್ಯಮ ಅವಧಿಯ ಹೈಬ್ರಿಡ್
» ಉತ್ತಮ ಕಾಯಿ ಒಡೆಯುವಿಕೆ ಮತ್ತು ಸುಲಭವಾಗಿ ಆಯ್ದುಕೊಳ್ಳುವಿಕೆ
» ಹೀರುವ ಕೀಟಗಳಿಗೆ ಸಹಿಷ್ಣು
» ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶ, ತೆಲಂಗಾಣ, ಕರ್ನಾಟಕ, ತಮಿಳುನಾಡು, ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ, ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ ಮತ್ತು ಗುಜರಾತ್ ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ



US 4753
(SWCH 4753 BG II)

» ದೊಡ್ಡ ಕಾಯಿ ಗಾತ್ರ
» ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಹೀರುವ ಕೀಟ ಸಹಿಷ್ಣುತೆ
» ಸರಪಳಿ ಕಾಯಿ ಬಿಡುವಿಕೆ ಮತ್ತು ಅಧಿಕ ಇಳುವರಿ
» ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶ, ತೆಲಂಗಾಣ, ಕರ್ನಾಟಕ, ತಮಿಳುನಾಡು, ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ, ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ ಮತ್ತು ಗುಜರಾತ್ ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ



US 4823
(SWCH 4823 BG II)

» ಬೇಗನೆ ಪಕ್ವವಾಗುವಿಕೆ
» ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿ ಒಡೆಯುವಿಕೆ ಮತ್ತು ಸುಲಭವಾಗಿ ಆಯ್ದುಕೊಳ್ಳುವಿಕೆ
» ಹತ್ತಿರದ ಅಂತರ ಮತ್ತು HDPS
» ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶ, ತೆಲಂಗಾಣ, ಕರ್ನಾಟಕ, ತಮಿಳುನಾಡು, ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ, ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ ಮತ್ತು ಗುಜರಾತ್ ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ



US Agriseeds®
Seed that Works

SEEDWORKS®

ಪತ್ತಿ ಸುಧಾರಿತ ಕೃಷಿ ಪದ್ಧತಿಗಳು



ಬೀಜದ ಪ್ರಮಾಣ

1.5-2 ಪ್ಯಾಕೆಟ್/ ಪ್ರತಿ ಎಕರೆಗೆ

ರಾಜ್ಯ	ಅಂತರ – (ಸಾಲಿಂದ ಸಾಲಿಗೆ ಮತ್ತು ಗಿಡದಿಂದ ಗಿಡಕ್ಕೆ)
ಕರ್ನಾಟಕ	90*30

ಗಿಡಗಳ ವಿಧಾನ ಮತ್ತು ಮಣ್ಣಿನ ಗುಣಧರ್ಮದ ಮೇಲೆ ಅಂತರವನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗುವುದು



ಕಳೆಗಳ ನಿಯಂತ್ರಣ

ಮೊದಲ 8-10 ವಾರಗಳಲ್ಲಿ ಕಠಿಣ ನಿರ್ಣಾಯಕ ದಿನಗಳು.
ಹಲ್ಲು ಜಾತಿಯ ಕಳೆಗಳ ನಿಯಂತ್ರಣಾಕ್ಕೆ: ಪೆಂಡಿಮ್ಯಾಥಲಿನ್ @ 1 ltr/acre (ಕಳೆ ಹುಟ್ಟುವ ಪೂರ್ವಭಾವಿ)
ಕ್ವಿಜಾಲಾಫಾಸ / ಫಿನಾಕ್ಸಾಪ್ರೋಪ -ಪಿ- ಎಥೈಲ್ @ 400ml ಪ್ರತಿ ಎಕರೆಗೆ (ಕಳೆ ಚಿಗುರಿದ ನಂತರ)
ಅಗಲ ಎಲೆಗಳ ಕಳೆ ನಿಯಂತ್ರಣಾ: ಪೈರಿತಿಯೊಬ್ಯಾಕ್ ಸೋಡೀಯಂ @ 300ml / ಪ್ರತಿ ಏಕರೆಗೆ



ರಾಸಾಯನಿಕ ಗೊಬ್ಬರದ ನಿರ್ವಹಣೆ (ಕೆಜಿ/ಪ್ರತಿ ಎಕರೆಗೆ)

ರಾಜ್ಯ	ಸಸಾರಜನಕ	ರಂಜಕ	ಪೊಟ್ಯಾಷ್
ಕರ್ನಾಟಕ	48	24	24





ಕೀಟಗಳ ನಿಯಂತ್ರಣ ರೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ ಕ್ರಮಗಳು

ಗುಲಾಬಿ ಕಾಯಿಕೊರಕ/ ಕೆಂಪು ಹುಳು : (ಪ್ರಮಾಣ/10 ಲೀಟರ್ ಗೆ)
ಚಟುವಟಿಕೆ 2 ಮೋಹಕ ಬೆಲೆಗಳು/ ಪ್ರತಿ ಎಕರೆಗೆ :
ಪತಂಗ ಚಟುವಟಿಕೆಯನ್ನು ನಿಗ ವಹಿಸಲು
ಸಂಯೋಗದ ಅಡಚಣೆಗಾಗಿ 8 ಮೋಹಕ ಬೆಲೆಗಳು/ ಪ್ರತಿ ಎಕರೆಗೆ
ಸಂಯೋಗದ ಅಡಚಣೆಗಾಗಿ
50-60 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ : ಬೇವಿನ ಕಷಾಯ@50ml
60- 90 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ : ಪ್ರೊಫೆನೊಫಾಸ್ @ 30 ml
ಕ್ಲೋರೋಪೈರಿಫಾಸ್ @ 25ml
90-120 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ : ಕ್ಲೋರ್ಯಾಸ್ @25ml
ಆಲ್ಫಾಮೆಥ್ರಿನ್@ 6ml
120 ದಿನಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು: ಸೈಪರ್ಮೆಥ್ರಿನ್ (10ಇಸಿ) @10ml
ಡೆಲ್ಟಾಮೆಥ್ರಿನ್@10ml

ರಸ ಹೀರುವ ಕೀಟಗಳು: ಪ್ರಮಾಣ/ ಏಕರೆಗೆ
ಬಿಳಿ ನೊಣ:
ಪೈರಿಪ್ರಾಕ್ಸಿಫೆನ್ @500ml/ ac
ಡಿನೋಟೆಫೂರಾನ್ 60gm/ac
ಬಿಳಿ/ಹಸಿರು ಜಿಗಿ:
ಫ್ಲೋನಿಕಾಮಿಡ್ @80gm/ac
ತಿಯೋಮಿತೋಕ್ಸಾಮ್ @ 50 gm/ ac
ಥ್ರಿಪ್ಸ್/ ಕಂದು ಜಿಗಿ:
ಸ್ಪೈನಟರಂ @170ml ac
ಪ್ರೊಫೆನಫಾಸ್ @500ml/ac

ಸೋರುಗು ರೋಗ:
ಬಿಜೋಪಾಚಾರ – 1 ಲೀಟರ್ ನೀರಿನಲ್ಲಿ 2 ಗ್ರಾಂ ಥೈರಂ ಬೆರಿಸಿ
ಬೇರುಣಿಸುವುದು – 1 ಲೀಟರ್ ನೀರಿನಲ್ಲಿ 2 ಗ್ರಾಂ
ಕಾರಬಂಡೇಜಿಯಂ ಬೇರಿಸಿ ಬೇರಿಗೆ ಬಿಡುವುದು.
ಬೇರು ಕೊಳೆಯುವಿಕೆ:
ಬೇರುಣಿಸುವುದು – 1 ಲೀಟರ್ ನೀರಿನಲ್ಲಿ 2 ಗ್ರಾಂ ಕಾರಬಂಡೇಜಿಯಂ
ಬೇರಿಸಿ ಬೇರಿಗೆ ಬಿಡುವುದು.

ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಅಂಗಾಮಾರಿ ರೋಗ:
ಬಿಜೋಪಾಚಾರ – 1 ಲೀಟರ್ ನೀರಿನಲ್ಲಿ
1.5 ಗ್ರಾಂ ಕಾರ್ಬಾಕ್ಸಿನ್ ಬೆರಿಸಿ ಬಿಜೋಪಾಚಾರ.
ಎಲೆಗಳಿಗೆ ಸಿಂಪರಣೆ ಪ್ರತಿ ಎಕರೆಗೆ ,
ಸಿ .ಒ .ಸಿ 500ಗ್ರಾಂ ಮತ್ತು ಅಗ್ರಿಮೈಸಿನ್
20 ಗ್ರಾಂ ನ್ನು ಸಿಂಪಡಿಸಿ Or – ಅಥವಾ :
Streptocyclin @3 gm/ac ಪ್ರತಿ ಏಕರೆಗೆ 3 ಗ್ರಾಂ
ಸ್ಟ್ರೆಪ್ಟೊಸೈಕ್ಲಿನ್ ಸಿಂಪಡಿಸಿ.
ತುದಿ ಬಾಡುವುದು:
ಪ್ರತಿ ಏಕರೆಗೆ 1 ಗ್ರಾಂ ಕೋಬಾಲ್ಟ್ ಕ್ಲೋರೈಡ್
ಸಿಂಪಡಿಸುವುದು.

ಇತರೆ ಮುಖ್ಯ ಅಂಶಗಳು

- ಬೆಳೆ ಪರಿವರ್ತನ & ಆಳವಾದ ಮಾಗಿ ಉಳುಮೆ
- ಲಘು ಪೋಷಕಾಂಶಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ – ಜಿಂಕ್ (1 ಗ್ರಾಂ/ ಲೀಟರ್) ಮತ್ತು ಬೋರಾನ್ (1-1.5 ಗ್ರಾಂ/ ಲೀಟರ್) ಗಳನ್ನು ಸಿಂಪರಣೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಗಿಡಗಳ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಸುಧಾರಿಸುವುದು
- ಕಳೆ ನಿಯಂತ್ರಣಾ , ರೋಗ ಮತ್ತು ಕೀಟಗಳ ಹಬ್ಬಲು ಸಹಕಾರಿಯಾಗುವ ಕಾಂಗ್ರೇಸ್ ಕಸವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವುದು/ ಬೆಳೆಯದಂತೆ ನಾಶಮಾಡಿ
- ಬೆಳೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ನಂತರ, ಬೆಳೆಯ ಅವಶೇಷಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಅರ್ಧ ತೆರೆದುಕೊಂಡ ಕಾಯಿಗಳನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಾಶಪಡಿಸುವುದು
- ಕೊಳೆರೋಗ, ಸೊರಗು ರೋಗ ಬರದಂತೆ ನೀರು ಬಸಿಯುವಂತೆ ಬಸಿ ಕಾಲುವೆ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು