US Agriseeds®
Seed that Works

SEEDWORKS®

SWCH 4749 BG II
(US 7067)

» पहिल्या 2 वेचणीत मोठे उत्पन्न
» मोठी बोंडे
» वेचणीस सोपे
» लवकर येणारे वाण
» महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश गुजरात साठी शिफारस केलेले



SWCH 4708 BG II
(US 4708)

» साखळी पद्धतीचे बोण्डे
» मध्यम कालावधीचे वाण
» खूप चांगल्या प्रकारे उमलणारी बोण्डे
» रसशोषक किडीं प्रति सहनशील
» महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश आणि गुजरात साठी शिफारस केलेले



SWCH 4753 BG II
(US 4753)

» मोठी बोंडे
» रसशोषक किडीं प्रति सहनशील
» साखळी पद्धतीचे बोण्डे आणि उच्च उत्पन्न
» महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश आणि गुजरात साठी शिफारस केलेले



SWCH 4823 BG II
(US 4823)

» लवकर येणारे
» वेचणीस एकदम सोपे
» जवळच्या अंतर आणि HDPS साठी उपयुक्त
» महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश साठी शिफारस केलेले



SWCH 4754 BG II
(US 4754)

» बोंडांची संख्या जास्त
» वेचणीस सोपे
» भरपूर उत्पादन
» महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश आणि गुजरात साठी शिफारस केलेले



US 704 BG II

» मोठी एकसमान बोन्डे
» चांगले बोंड धारणा
» रसशोषक किडीं प्रति सहनशील
» महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश आणि गुजरात साठी शिफारस केलेले



US Agriseeds®
Seed that Works

SEEDWORKS®

कापूस पिकाचे व्यवस्थापन



बियाण्याचे प्रमाण

»1.5 - 2 पॅकेट/एकर

राज्य	अंतर: (ओळी ते ओळी आणि झाड ते झाड)
महाराष्ट्र/एमपी	120*60

पिकाचा प्रकार आणि जमीनीचा प्रकारानुसार अंतर बदलणे आवश्यक आहे



तण नियंत्रण

पहिल्या 8-10 आठवड्यात गंभीर
तण नियंत्रण: पेंडीमेथालिन @ 1 लीटर/एकर (उगवणी पूर्व आवश्यक)
क्विझलाफॉप इथाइल/ फेनोक्साप्रॉप-पी-इथिल @ 400 मिली/एकर (उगवाणी नंतर)
पसरट पानाचे तण नियंत्रण: पायरिथिओबॅक सोडियम @ 300 मिली/एकर (लवकर उगवाणी नंतर)



खत नियोजन

राज्य	नत्र	स्फुरद	पालाश
महाराष्ट्र -खान्देश	40-50	20-25	20-25
महाराष्ट्र -मराठवाडा	50-60	25-30	25-30
महाराष्ट्र -विदर्भ	25-50	12-24	12-24





कीड नियंत्रण & रोग नियंत्रण

गुलाबी बोंड अळी: (डोस/10 लिटर पाणी)
फेरोमोन सापळे: 2 सापळे/एसी - पतंगाच्या क्रियेचे निरीक्षण करणे
8 सापळे/एकर- प्रणयक्रीडा व्यत्ययासाठी
50 ते 60 दिवस: कडुलिंबाचे तेल @ 50 मिली
60 ते 90 दिवस: प्रोफेनोफॉस @ 30 मिली
क्लोरोपायरीफॉस @ 25 मिली
90 ते 120 दिवस: क्विनालफॉस @ 25 मिली
अल्फामेथ्रीन @ 6 मिली
120 दिवसांपेक्षा जास्त: सायपरमेथ्रिन (10 ई सी)@10 मिली
डेल्टामेथ्रीन @ 10 मिली

रसशोषक कीड: (डोस/एकर)
पांढरी माशी: पायरीप्रॉक्सीफेन @ 500 मिली
डायनोटेफुरान @ 60 ग्रॅम
हिरवे तुडतुडे : फ्लॉनिकॅमिड @ 80 ग्रॅम
थायामेथोक्सम @ 40 ग्रॅम
फूलकिडे: स्पिनेटोरम @ 170 मिली
प्रोफेनोफॉस @ 500 मिली

फुसेरियम विल्ट: (बुरशीजन्य मर)
बीजप्रक्रिया -थायरम - २-ग्रॅम/किलो
कार्बेन्डाझिम @ 2 ग्राम/लिटर पाण्यात भिजवणे
मूळकुज :
कार्बेन्डाझिम @ 2 ग्राम/लिटर पाण्यात भिजवणे

बॅक्टेरियल ब्लाइट: (जिवाणूजन्य करपा)
कार्बोक्सिन @ 1.5 ग्रॅम/किलो बियाण्यावर बीजप्रक्रिया करा
सि ओ सि @500 ग्राम + ऍग्रोमायसिन 20 ग्राम किंवा
स्ट्रेप्टोसायक्लिन @ 3 ग्राम/एकर फवारणी
पॅराविल्ट: (मर रोग)
कोबाल्ट क्लोराईड @ 1 ग्राम फवारणी करा

इतर महत्त्वाच्या बाबी :

» पीक फेरपालट आणि खोल नांगरणी
» वनस्पतींच्या वाढीसाठी आणि विकासासाठी सूक्ष्म अन्नद्रव्य - झिंक (1 ग्रॅम/लिटर) आणि बोरॉन (1.1.5 ग्रॅम/लिटर) वापरा
» कीटक आणि रोगांचा प्रादुर्भाव टाळण्यासाठी तण नियंत्रण गवत प्रामुख्याने काँग्रेस गवत आवश्यक आहे
» उरलेल्या खोडांची आणि अर्धवट उमललेलं बोंड साफ करा
» मररोग टाळण्यासाठी शेतात पाण्याचा निचरा चांगला ठेवा