US 51 SUPER
(SWCH 4744 BG II)

» ਘੱਟ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਉਤਪਾਦਨ
» ਚੰਗਾ ਖਿੜਾਓ ਅਤੇ ਆਸਾਨ ਚੁਗਾਈ
» ਹਲਕੀ ਤੋਂ ਦਰਮਿਆਨੀ ਜ਼ਮੀਨ ਲਈ
» ਰਾਜਾਂ ਲਈ ਸਿਫਾਰਸ਼ੀ – ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ



US 51 SUPER PLUS
(SWCH 4750 BG II)

» ਘੱਟ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਉਤਪਾਦਨ
» ਚੰਗਾ ਖਿੜਾਓ ਅਤੇ ਆਸਾਨ ਚੁਗਾਈ
» ਹਲਕੀ ਤੋਂ ਦਰਮਿਆਨੀ ਜ਼ਮੀਨ ਲਈ
» ਰਾਜਾਂ ਲਈ ਸਿਫਾਰਸ਼ੀ – ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ



US 71
(SWCH 4755 BG II)

» ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਦਾਵਾਰ
» ਮੱਧਮ ਪਰਿਪੱਕਤਾ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ
» ਦਰਮਿਆਨੀ ਤੋਂ ਭਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਲਈ
» ਰਾਜਾਂ ਲਈ ਸਿਫਾਰਸ਼ੀ – ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ



US 81
(SWCH 4757 BG II)

» ਲੜੀਦਾਰ ਟੀਂਡੇ
» ਰਸ ਚੂਸਕ ਕੀੜਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲ
» ਮਧਿਅਮ ਤੋਂ ਭਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਸਤੇ ਉਪਯੁਕਤ
» ਰਾਜਾਂ ਲਈ ਸਿਫਾਰਸ਼ੀ – ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ



US 91
(SWCH 4748 BG II)

» ਵੱਡੇ ਟੀਂਡੇ
» ਦਰਮਿਆਨੀ ਤੋਂ ਹਲਕੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਲਈ
» ਰਸਚੂਸਕ ਕੀੜਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸਹਿਨਸ਼ੀਲ
» ਸਿਫਾਰਸ਼ -ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ,ਰਾਜਸਥਾਨ



US 4141
(SWCH 4735 BG II)

» ਵੱਧ ਟੀਂਡੇ ਅਤੇ ਵੱਧ ਝਾੜ
» ਚੰਗਾ ਖਿੜਾਓ ਅਤੇ ਚੁਗਾਈ ਵਿੱਚ ਆਸਾਨ
» ਪੱਤਾ ਮਰੋੜ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਚੰਗੀ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ
» ਸਿਫਾਰਸ਼ -ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ,ਰਾਜਸਥਾਨ



US Agriseeds®
Seed that Works

SEEDWORKS®

ਨਰਮਾ ਦਾ ਫਸਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ



ਬੀਜ ਮਾਤਰਾ

1.5 ਤੋਂ 2 ਪੈਕੇਟ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਡ੍ਰਿਲ ਨਾਲ ਬਿਜਾਈ

ਸੂਬਾ	ਦੂਰੀ (ਲਾਈਨ ਤੋਂ ਲਾਈਨ ਅਤੇ ਪੌਦੇ ਤੋਂ ਪੌਦੇ)
ਹਰਿਆਣਾ	105*60
ਪੰਜਾਬ/ਰਾਜਸਥਾਨ	67.5*67.5

ਦੂਰੀ ਪੌਦੇ ਅਤੇ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਘੱਟ ਜਾਂ ਵੱਧ ਸਕਦੀ ਹੈ



ਨਦੀਨ ਪ੍ਰਬੰਧਨ

ਪਹਿਲੇ 8-10 ਹਫ਼ਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ

ਘਾਹ ਜਾਤੀ ਕੱਖਾਂ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ: ਪੈਡੀਮੈਥਾਲੀਨ 1 ਲੀ. ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ (ਉੱਗਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ)

ਕਯੂਜਲਾਫੋਪ ਇਥਾਇਲ/ਫੈਨੋਕਸਾਪ੍ਰਾਪ- ਪੀ- ਏਥਲ 400 ਮਿ.ਲੀ. ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ (ਉੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ)

ਚੌੜੇ ਪੱਤੇ ਵਾਲੇ ਕੱਖਾਂ ਵਾਸਤੇ:ਪਾਈਰਿਥਿਓਬੈਕ ਸੋਡੀਅਮ 300 ਮਿ.ਲੀ./ਏਕੜ (ਉੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ)



ਖਾਦ ਪ੍ਰਬੰਧਨ (Kgs/Ac)

ਸੂਬਾ	(N) ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ	(P) ਫਾਸਫੋਰਸ	(K) ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ
ਹਰਿਆਣਾ	60	24	24
ਪੰਜਾਬ	60	12	0
ਰਾਜਸਥਾਨ	60	16	8





ਕੀਟ, ਰੋਗ ਪ੍ਰਬੰਧਨ

ਗੁਲਾਬੀ ਸੁੰਡੀ : (ਮਾਤਰਾ/10 ਲੀ. ਪਾਣੀ)
ਫੇਰੋਮੋਨ ਟਰੈਪ : 2 ਟਰੈਪ/ਏਕੜ ਤਿੱਤਲੀ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ 8 ਟਰੈਪ/ਏਕੜ ਸੰਭੋਗ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਲਈ
50 ਤੋਂ 60 ਦਿਨ: ਨਿੰਮ ਅਧਾਰਿਤ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ 50 ਮਿ.ਲੀ.
60 ਤੋਂ 90 ਦਿਨ: ਪ੍ਰੋਫੇਨੋਫਾਸ 30 ਮਿ.ਲੀ.
ਕਲੋਰੋਪੈਰੀਫਾਸ: 25 ਮਿ.ਲੀ.
90 ਤੋਂ 120 ਦਿਨ: ਕੁਇਨਾਲਫਾਸ 25 ਮਿ.ਲੀ.
ਅਲਾਫਲੋਰਬੇਰਿਨ 6 ਮਿ.ਲੀ.
120 ਦਿਨਾਂ ਤੇ: ਸਾਈਪਰਮੇਥਰਿਨ (10 EC)10ਮਿ.ਲੀ.
ਡੈਲਟਾਮੇਥਰਿਨ 10 ਮਿ.ਲੀ.

ਰਸਚੂਸਕ ਕੀਟਾਂ ਲਈ (ਮਾਤਰਾ/ਏਕੜ)
ਚਿੱਟੀ ਮੱਖੀ : ਪਾਈਰੀਪ੍ਰੋਕਸੀਫਿਨ 500 ਮਿ.ਲੀ./ਏਕੜ
ਡਾਇਨੋਟੇਫਿਊਰਾਨ 60 ਗ੍ਰਾਮ/ਏਕੜ
ਹਰਾ ਤੇਲਾ: ਫਲੋਨੀਕਾਮਿਡ 80 ਗ੍ਰਾਮ/ਏਕੜ
ਥਾਇਓਪ੍ਰੋਫੈਕਸਮ 40 ਗ੍ਰਾਮ/ਏਕੜ
ਭੂਰੀ ਜੂੰ : ਸਪਾਈਨੈਟੋਰਮ 170 ਮਿ.ਲੀ./ਏਕੜ
ਪ੍ਰੋਫੇਨੋਫਾਸ 500 ਮਿ.ਲੀ./ਏਕੜ

ਫਿਊਜੇਰੀਅਮ ਵਿਲਟ
ਬੀਜ ਉਪਚਾਰ - ਥਾਇਵੇਰਾ 2 ਗ੍ਰਾਮ/ਕਿਲੋ ਬੀਜ
ਛਿੜਕਾਓ - ਕਾਰਬਨਡਾਜ਼ੀਮ 2 ਗ੍ਰਾਮ/ਲੀ.ਪਾਣੀ
ਜੜ੍ਹ ਗਲਣ
ਛਿੜਕਾਓ - ਕਾਰਬਨਡਾਜ਼ੀਮ 2 ਗ੍ਰਾਮ/ਲੀ.ਪਾਣੀ

ਬੈਕਟੀਰੀਅਲ ਬਲਾਈਟ ਬੀਜ ਉਪਚਾਰ
ਬੀਜ ਉਪਚਾਰ:
ਕਾਰਬੋਕਸਿਨ 1.5 ਗ੍ਰਾਮ/ਕਿਲੋ ਬੀਜ ਪੱਤਿਆਂ ਤੇ ਛਿੜਕਾਅ ਵਾਸਤੇ ** 500 ਗ੍ਰਾਮ + ਅਗ੍ਰੀਮਾਈਸਿਨ 20 ਗ੍ਰਾ/ਏਕੜ ਜਾਂ ਸਟ੍ਰੈਪਟੋਸਾਈਕਲੀਨ 3 ਗ੍ਰਾਮ/ਏਕੜ
ਪੈਰਾਵਿਲਟ
ਸਪ੍ਰੇ: ਕੋਬਾਲਟ ਕਲੋਰਾਈਡ 1 ਗ੍ਰਾਮ/ 100 ਲੀਟਰ ਪਾਣੀਏਕੜ ਵਿੱਚ ਛਿੜਕਾਅ ਕਰੋ

ਹੋਰ ਮੁੱਖ ਨੁਕਤੇ

- ਫਸਲ ਚੱਕਰ ਅਤੇ ਡੂੰਘੀ ਜੁਤਾਈ
- ਸੂਖਮ ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਮਾਤਰਾ: ਜ਼ਿੰਕ (1 ਗ੍ਰਾਮ/ਲੀ), ਬੋਰੋਨ (1-1.5 ਗ੍ਰਾਮ/ਲੀ.), ਬੂਟੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ।
- ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ ਨਾਈਟ੍ਰੇਟ (13:0:45) ਦੀ ਸਪ੍ਰੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰੋ।
- ਕੀੜੇ ਅਤੇ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲਈ ਨਦੀਨਾਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ।
- ਬਚੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਛਟੀਆਂ ਅਤੇ ਅੰਸ਼ਕ ਤੌਰ ਤੇ ਖੁੱਲੇ ਟੀਂਡਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਫ ਕਰਨਾ।
- ਸੋਕੇ ਤੋਂ ਬਚਨ ਲਈ ਖੇਤ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਚੰਗੀ ਨਿਕਾਸੀ ਬਨਾਈ ਰੱਖੋ ।