US Agriseeds®
Seed that Works

SEEDWORKS®

US 7067
(SWCH 4749 BG II)

» முதல் 2 அறுவடைகளில் முக்கிய மகசூல்
» பெரிய காய் அளவு
» எளிதாகப் பறிக்கும் தன்மை
» MH, GJ, MP, AP, TS, KA மற்றும் TN மாநிலங்களுக்குப் பரிந்துரைக்கப்படுகிறது



US 704 BG II

» பெரிய மற்றும் சீரான காய்கள்
» நல்ல காய் தக்கவைப்பு
» உறிஞ்சும் பூச்சிகளுக்கு சகிப்புத்தன்மை
» AP, TS, KA, TN, MH, MP மற்றும் GJ மாநிலங்களுக்குப் பரிந்துரைக்கப்படுகிறது



US 707 BG II

» அதிக எண்ணிக்கையிலான காய்கள் மற்றும் அதிக மகசூல்
» மன அழுத்த சகிப்புத்தன்மை
» நல்ல காய் வெடித்தல் மற்றும் சிறந்த பறிக்கும் தன்மை
» AP, TS, KA, TN மாநிலங்களுக்குப் பரிந்துரைக்கப்படுகிறது



US 4708
(SWCH 4708 BG II)

» சங்கிலி காய்த்தல் மற்றும் அதிக மகசூல்
» மத்திய கால வீரிய ஒட்டு ரகம்
» நல்ல காய் வெடித்தல் மற்றும் எளிதாகப் பறிக்கும் தன்மை
» உறிஞ்சும் பூச்சிகளுக்கு சகிப்புத்தன்மை
» MH, GJ, MP, AP, TS, KA மற்றும் TN மாநிலங்களுக்குப் பரிந்துரைக்கப்படுகிறது



US 4753
(SWCH 4753 BG II)

» பெரிய காய் அளவு
» சிறந்த உறிஞ்சும் பூச்சி சகிப்புத்தன்மை
» சங்கிலி காய்த்தல் மற்றும் அதிக மகசூல்
» MH, GJ, MP, AP, TS, KA மற்றும் TN மாநிலங்களுக்குப் பரிந்துரைக்கப்படுகிறது



US 4823
(SWCH 4823 BG II)

» முன்கூட்டிய முதிர்ச்சி
» சிறந்த வெடித்தல் மற்றும் எளிதாகப் பறிக்கும் தன்மை
» நெருக்கமான இடைவெளி மற்றும் HDPS
» MH, GJ, MP, AP, TS, KA மற்றும் TN மாநிலங்களுக்குப் பரிந்துரைக்கப்படுகிறது



US Agriseeds®
Seed that Works

SEEDWORKS®

கலப்பின பருத்தி செயல்முறை தொகுப்பு



விதை அளவு

ஏக்கருக்கு 1.5-2 பாக்கெட்

மாநிலம்	இடைவெளி:(பாத்திக்கு பாத்தி மற்றும் பயிருக்கு பயிர்)
தமிழ்நாடு	90*90

செடியின் தன்மை மற்றும் மண் வகைக்கேற்ப இடைவெளி மாற்றியமைத்தல் அவசியம்




களைக்கட்டுபாடு

மிக அவசியமானது 8 வாரம் முதல் 10 வாரம் வரை
புல்வகை களை கட்டுபாடு : பென்டிமெத்தாலின் ஏக்கருக்கு @1 லிட்
(களை முளைப்பதற்கு முன்) குஷ்லாபாப் ஈத்தைல்/பெனாக்க்ஷோபிராப @400 மிலி /ஏக்கர்
(களை முளைத்த பின்)
அகன்ற இலை களை கட்டுபாடு: பைரித்தியோபேக் சோடியம் @ 300 மிலி/ ஏக்கர்
(களை முளைத்த உடன்)



உரம் மேலாண்மை
(கிலோகிராம்/ஏக்கர்)

மாநிலம்	நைட்ரஜன்	பாஸ்பரஸ்	பொட்டாசியம்
தமிழ்நாடு	48	24	24





பூச்சி மேலாண்மை
நோய் மேலாண்மை

இளம் சிவப்பு காய் புழு:
(மருந்தளவு/10 லிட் தண்ணீருக்கு)
இனக்கவர்ச்சி பொறி : 2 பொறிகள்/1 ஏக்கருக்கு
(அந்து பூச்சியின் செயல்பாட்டை கண்காணித்தல்)
2 பொறிகள்/1 ஏக்கருக்கு(அந்து பூச்சியின
இனச்சேர்க்கை இடையூறுக்காக
மருந்தளவு/ 10 லிட் தண்ணீருக்கு
50 - 60 நாளில்: வேப்ப எண்ணெய் @50 மிலி
60-90 நாளில்: புரோபினோபாஸ் @30 மிலி
குளோரிபைரிப்பாஸ்@25 மிலி
90-120 நாளில்: குயினால்பாஸ்@25 மிலி
ஆல்பாமெத்ரின் @6மிலி

சார் உறிஞ்சும் பூச்சி:
(மருந்தளவு/ஏக்கருக்கு)
வெள்ளை ஈ :
பைரிபிராக்ஸிபென் @ 500மிலி /ஏக்கர்
டைபினோபியுரான் @ 60 கிராம்/ஏக்கர்
தத்துப்பூச்சி:
புளோனிக்கமைய்டு @80 கிராம்/ஏக்கர்
தயோமீத்தாக்ஸம் @40 கிராம்/ஏக்கர்
இலைப்பேன்:
ஸ்பினோட்ரம் @170 மிலி/ஏக்கர் புரோபினோபாஸ்
@500மிலி/ஏக்கர்

பிஸோரியம் வாடல்:
விதை நேர்த்தி திரம் உடன்@ 2 கி/கிலோ விதை
கார்பன்டசிம் வேர் நனைத்தல் @ 2 கி/ லிட்டர்
தண்ணீர்
வேர் அழுகல்:
கார்பன்டசிம் வேர் நனைத்தல்@ 2 கி/ லிட்டர்
தண்ணீர்

பாக்டீரியல் ப்ளைட்:
விதை நேர்த்தி கார்பாக்ஸின் உடன்@ 1.5 கி/கிலோ
விதை இலை வழி தெளிப்பு பைட்டலான் @ 500 கி +
அக்ரி மைசின் @20கி/ஏக்கர் (அ) ஸ்ப்டோ சைக்ளின்
@3கி/ஏக்கா
பாரா வடால் :
ஸ்பிரேகோபால்ட் குளேரைடு @1கி/ஏக்கர்

மற்ற முக்கிய குறிப்புகள :

» பயிர் சுழற்சி முறை கோடை உழவு மற்றும் ஆழ உழுவுதல
» நுண்ணுட்ட உரம் அளித்தல் ஜிங் 1 கி/லிட்டர் மற்றும் போரான் (1-1.5 கி/லிட்டர்) பயிர் வளர்ச்சி மற்றும் ஊக்கத்திற்கு
» முக்கியமாக காங்கிரஸ் களை கட்டுபாடு அவசியம் நோய் மற்றும் பூச்சி பரவலைத் தடுப்பதற்கு
» வயலில் எஞ்சிய தண்டுகள் மற்றும் பகுதியளவு திறந்த காய்களை சுத்தம் செய்தல்
» வயலில் நல்ல வடிகால் வசதி அமைத்தல் அவசியம் வாடல் நோயைத் தடுக்க