

US 5210

- » પાકવાનો સમયગાળો ૧૩૫-૧૪૦ દિવસ
- » મધ્યમ ઊંચાઈના છોડ
- » આકર્ષક મોટા ભરાવદાર અને સ્વાદિષ્ટ દાણા વધારે ઉત્પાદન



US 5310



- » પાકવાનો સમયગાળો ૧૩૦-૧૩૫ દિવસ
- » મધ્યમ ઊંચાઈના છોડ
- » લાંબી અને આકર્ષક ડુંડી સાથે ચમકદાર દાણા, વધુ ઉત્પાદન

US 5410

- » પાકવાનો સમયગાળો ૧૩૦-૧૩૫ દિવસ
- » મજબૂત છોડ-સુકારો પ્રત્યે સહનશીલ
- » લાંબી ડુંડી - વધારે દાણા-વધુ ઉત્પાદન



ઘઉંની ખેતી પદ્ધતિ

ખેતર ની તૈયારી

ખેતરને 2 થી 3 વાર ખંડાણ અને નીંદણ કાઢીને સારી રીતે તૈયાર કરો અને બે અઠવાડિયા પહેલા છાણિયા ખાતરનો ઉપયોગ ખેતરમાં કરી.

વાવેતર

વાવેતર સમય	ઓક્ટોબર-ડિસેમ્બર
બિયારણ	૪૦ કિલ્લી /એકર
અંતર	૨૦ થી ૨૦ સેમી છોડ થી છોડ ૧૦ સેમી
ઊંડાઈ	૫-૪ સમી

ખાતર ની માહિતી

ખાતરોનો ઉપયોગ જમીન પરીક્ષણ ના આધારે અને સ્થાનિક કૃષિયુનિવર્સિટી ભલામણોના આધારે કરવો જોઈએ. ખાતરોની સામાન્ય રીતે ભલામણ કરેલ માત્રા નીચે આપેલા કોષ્ટક મુજબ છે.

ખાતર	નિયંત્રણ
યુરિયા	60 કિગ્રા /પ્રતિ એકર
ડી.એ.પી	24 કિગ્રા /પ્રતિ એકર
એમ.ઓ.પી	16 કિગ્રા /પ્રતિ એકર

પાણી આપવા ની માહિતી

નીચે આપેલા કોષ્ટકમાં ઘઉં ની ખેતી પદ્ધતિ માં ઘઉં ની અવસ્થા ના આધારે પાણી આપવું અને યોગ્ય ભેજ નું સ્થર જાળવી રાખવું ખેડૂતો મિત્રો નીચે આપેલા કોસ્ટક મુજબ પાક ની સિંચાઈ કરી સકે છે

સિંચાઈ	વાવેતર ના 21 દિવસ પછી	વાવેતર ના 45 દિવસ પછી	વાવેતર ના 65 દિવસ પછી	વાવેતર ના 85 દિવસ પછી	વાવેતર ના 105 દિવસ પછી	વાવેતર ના 120 દિવસ પછી
1. સિંચાઈ	✓					
2. સિંચાઈ	✓			✓		
3. સિંચાઈ	✓		✓		✓	
4. સિંચાઈ	✓	✓	✓		✓	
5. સિંચાઈ	✓	✓	✓	✓	✓	
6. સિંચાઈ	✓	✓	✓	✓	✓	✓

નીંદણ નીયંત્રણ

ઘઉંના પાકમાં નીંદણના નીયંત્રણ માટે નીચે આપેલા રસાયણોનો ઉપયોગ કરો.

નીંદણ	જંતુનાશક	માત્રા ગ્રામ	છંટકવા ના દિવસો
પોહળાં પાંદડા વાળા નીંદામણ	ક્લોડીનાફોપ	24	વાવણી પછી 30-35 દિવસ
ઘાસ અને પોહળા પાંદડા વાળા નિદામાન	મેટસલ્ફ્યુરોન મિથાઇલ	1.6	વાવણી પછી 30-35 દિવસ
ઘાસ અને પોહળા પાંદડા વાળા નિદામાન	સલ્ફોસલ્ફ્યુરોન	10	વાવણી પછી 30-35 દિવસ

કિટનાશક દવા ની માહિતી

ઘઉંમાં મુખ્ય જીવાતો અને રોગો માટે ભલામણ કરાયેલા રાસાયણિક નિયંત્રણ પગલાં નીચે મુજબ છે

રોગો	પ્રબંધન
ગેરું	પ્રોપીકોનાઝોલ 25 ઇસી @ 0.1% (80 લીટર પાણી/એકર) છંટકાવ કરો.
મોલો	ઇમીડાક્લોપ્રાઇડ 200 SL @ 8 ગ્રામ/એકર વાપરો
ઉધઈ	ક્લોરોપાયરીફોસ 20 ઇસી @ 1.2 લિટર/એકર
ડુંડી નો અંગારિયો	કાર્બોક્સિન (95 ડબલ્યુપી) @ ૨૫ ગ્રામ/કિગ્રા બીજ સાથે બીજ માવજત
પાનનો અંગારિયો	કાર્બોક્સિન (95 WP @ ૨૫ ગ્રામ/કિગ્રા બીજ) સાથે બીજ માવજત

વણણી:

ઘઉંના દાણા કઠણ થઈ જાય અને છોડ સોનેરી પીળા થઈ જાય ત્યારે કાપણી કરો. સમયસર કાપણી કરવાથી દાણા ખરી પડવાથી અને પાક પડી જવાથી થતા નુકસાનને ઘટાડી શકાય છે.