

यदि स्रों में कमी रह जाती है, तो निम्न खरपतवार बच सकते हैं
ऐसे में निम्नलिखित खरपतवारनाशकों का उपयोग करें

इकाइनोक्लोआ रूसगैली और कोलोना (शैक/थैकी)



छिकाव	खरपतवारनाशक का नाम	मात्रा (प्रति एकड़)
पहला	वजीर	400 मि.ली.
दूसरा	बिसपायरिचैक सोडियम+वजीर	120 मि.ली. + 400 मि.ली.

साइप्रेस प्रजाति (सेज मोथा)



लोएक्लोआ चिनोसिस घास (झाड़ घास)



छिकाव	खरपतवारनाशक का नाम	मात्रा (प्रति एकड़)
पहला	वजीर	400 मि.ली.
दूसरा	बासाग्राम/वैटाजोन 48% वा पाइयाजोस्टफ्यूरॉन 70%+वजीर	120 मि.ली. या 300 मि.ली. + 400 मि.ली.

1. एट्रोस्टिस प्रजाति- चिड़ी घास 2. डैक्टाइलोपेनियम एजिस्टिम (मकड़ा घास)



जोट- निर्देश में से कोई एक, दूसरे स्प्रे के लिए अपना।

खरपतवार के नियंत्रण के लिए नीचे दिए गए खरपतवारनाशकों का उपयोग करें

1. ट्रायलिंग्मा प्रजाति पथरवट्टा-चौड़ी पत्तियाँ
2. पॉर्टलाका एस.पी. गुलदेपहरी
(नियंत्रण करना कठिन)



छिकाव	खरपतवारनाशक का नाम	मात्रा (प्रति एकड़)
पहला	मेटसल्फ्यूरॉन मिथाइल +वजीर	8 ग्राम +400 मि.ली.
दूसरा	यदि बाद के चरण में देखा जाए तो - 2-4डी (अमाइन साल्ट 58%प्सारेल) + सोडियम साल्ट खेत में एक सप्ताह तक पानी भर दें	120 मि.ली. +400 मि.ली.

एमारेंथस प्रजाति-केसर (नियंत्रण करना कठिन)



ग्लाइसिन प्रजाति-जंगली सोयाबीन चौड़ी पत्तियाँ (अनियंत्रित)



छिकाव	खरपतवारनाशक का नाम	मात्रा (प्रति एकड़)
पहला	मेटसल्फ्यूरॉन मिथाइल +वजीर	8 ग्राम +400 मि.ली.
दूसरा	बिसपायरिचैक सोडियम गा फेनोक्सायांप +वजीर	800 मि.ली. +400 मि.ली.

जोट- निर्देश में से कोई एक, दूसरे स्प्रे के लिए अपना।

अन्य जानकारी

सिंचाई

- ◆ खेत में उचित नमी बनाये रखें
- ◆ खेत में पानी खड़ा न होने दें
- ◆ वजीर स्प्रे के बाद 24 घंटे तक सिंचाई न करें
- ◆ बीज व खरपतवारनाशी एक साथ खरीदें
- ◆ सिर्फ वजीर खरपतवारनाशी का ही इस्तेमाल करें
- ◆ पानी के प्रवाह को साथ गाले खेत में न जाने दें
- ◆ वजीर का इस्तेमाल अन्य धान पर न करें, सिर्फ फुलपेज® पर ही करें
- ◆ धान और गेहूं/दालों की फसल चक्र के लिए उपयुक्त
- ◆ धान और आलू की फसल चक्र के उपयोग से बचें

FULL PAGE®
Rice Cropping Solution




फुलपेज खेती की महत्वपूर्ण
जानकारी एवं सुझाव

खेती की तैयारी व बुआई



- ◆ बुआई का सही समय - मध्य भारत 5 जून से 20 जून
- ◆ मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ़ के लिए बीज दर-10.5 किलो प्रति एकड़
- ◆ लेजर लेवलर से खेत को समतल करें,
तथा उचित नमी पर 2-3 cm की गहराई में सीड़ ड्रिल के
माध्यम से सीधी बुवाई करें

उर्वरक प्रबंधन




फसल अवस्था	डीएपी कि./एकड़	यूएया कि./एकड़	पोटाश कि./एकड़ (33%)	ZnSO4 कि./एकड़	चिलेटेड आयरन कि./एकड़
बुआई के समय	30-50	-	20	-	-
12-15 दिन पर		20	-	5	-
30-35 दिन पर		40	-	-	1
50-60 दिन पर		40	20	-	-

प्रारंभिक अवस्था में नाइट्रोजेन उर्वरक का उपयोग पौधों की तिलिंग (कल्ले निकलना) और फसल की स्थापना में सहायक होता है।

नोट- अधिक उत्पादन के लिए निम्नलिखित छिड़काव का पत्तियों पर छिड़काव करें।

- जिंक 39.5 % का पत्तियों पर स्प्रे 50-55 दिन पर,
खुएक : 250 मिली./एकड़
- उर्वरक : 13-0-45 का पत्तियों पर स्प्रे 60-70 दिन पर,
खुएक : 1.5 ग्राम/लीटर पानी

• सही अवस्था



खरपतवार की वृद्धि पर

0-7 दिन 8-14 दिन 15-21 दिन 22-28 दिन 29 दिन

2 से 3 पत्ती अवस्था खरपतवार

खरपतवारनाशक का सही उपयोग

खरपतवारनाशक के घोल बनाने की विधि

1 एकड़ खुएक (2 अवेदन)



पहला छिड़काव

वजीर - 400 मिली. प्रति एकड़ की दर से खरपतवारों की 2-3 पत्ती की अवस्था में, बुआई के 10-12 दिन बाद

वजीर लगाने से पहले खेत में उचित नमी बनाएं एवं छिड़काव के 24 घंटे बाद फसल की सिंचाई करें।

दूसरा छिड़काव

वजीर-400 मिली. प्रति एकड़ की दर से पहले छिड़काव के 15 दिन बाद या खरपतवारों की 2-3 पत्ती की अवस्था में

खरपतवारनाशक की निर्धारित मात्रा का उपयोग करें।


सही नोजल का चुनाव

हमेथा सही प्रकार के नोजल का उपयोग करें।



- कट नोजल या फ्लेट फेन नोजल का इस्तेमाल करें।
- छिड़काव के समय खेत में उचित नमी रखें।
- छिड़काव के बाद 6-8 घंटे तक वर्षा मुक्त वातावरण होना चाहिए।
- खरपतवरनाशी का उपयोग निर्देशानुसार ही करें।

• सही उपयोग



• स्प्रे की गति को स्थिर रखना नहीं पूर्ण

स्प्रेर के बूम को सीधी रेखा में रखें, कंचा-नीचा ना करें।

छिड़काव के दौरान अतिव्यापी (ओवरलेपिंग) से बचे, क्योंकि इससे फसल पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है।